Мониторинг событий Эль-Ниньо (Ла-Нинья) по данным спутниковых наблюдений температурного и радиационного режима в экваториальной части Тихого океана

V ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ, ДИНАМИКА АТМОСФЕРЫ И КЛИМАТА»
19–21 ноября 2024
г. Москва

Кошель А.А., Червяков М.Ю.
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия

Радиометр ИКОР-М - измеритель отраженной солнечной радиации на ИСЗ серии «Метеор-М»

Корреляционная диаграмма среднемесячных значений альbedo по ячейкам сетки за август 2014 г

Коэффициент линейной корреляции значений альbedo равен $0,7309 \pm 0,0071$

Коэффициент для приведения величин потоков отраженной коротковолновой радиации и значений альbedo первого спутника к шкале второго измерителя равен $0,9071 \pm 0,0031$.

Значения альbedo над разными пустынями по данным измерителя ИКОР-М на борту ИСЗ «Метеор-М» № 1. Сплошными линиями показаны линейные тренды.

Карты среднемесячного распределения альбедо до (верхняя) и после (нижняя) обработки данных Май 2015 года

Отношение площади ячейки сетки к площади приэкваториальной ячейки в зависимости от широты границы зоны

Индекс ONI - 3-месячное скользящее среднее АТПО в регионе Niño 3,4, на основе центрированных 30-летних базовых периодов

Средние значения АТПО в период с 10 января по 6 февраля 2016 г

* График взят с сайта National Center for Environmental Information NOAA

* Изображение взято с сайта Climate Prediction Center / NCEP

Червяков М.Ю., Спирихина А.А.

Мониторинг событий Эль-Ниньо (Ла-Нинья) в Тихом океане по данным спутниковых радиометров ИКОР-М

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о Земле. 2019. Т. 19. Вып. 1. С. 35–41.

Пространственно-временное распределение облачности в экваториальной зоне Тихого океана за период с января 2010 по февраль 2020 г.

Карта среднемесячного глобального распределения облачности за апрель 2021 г по данным NASA Earth Observations (NEO)

Пространственно-временное распределение альbedo в экваториальной зоне Тихого океана по данным ИКОР-М на ИСЗ «Метеор-М» № 1 и № 2 с января 2010 года по август 2019 года

Шаблон для расчетов среднемесячных величин альbedo по меридиональным разрезам шириной в $2,5^\circ$ от 5° с.ш до 5° ю.ш.

Временной ход величин альbedo для регионов Nino 1+2, 3, 4, 3.4

Временной ход поглощенной солнечной радиации для регионов Nino 1+2, 3, 4, 3.4

Отклонения от среднемесячных значения альbedo и ТПО для регионов Niño за период с января 2010 года по август 2019

Niño 1+2

Niño 3

- Эль-Нинья
- Ла-Нинья
- Нормальное состояние

Niño 3.4

Niño 4

- Отклонения от среднемесячных значений ТПО
- Отклонения от среднемесячных значений альbedo

Скользящее среднее (3-месячное) АТПО и отклонений от среднемесячных значений альbedo для регионов Nino за период с января 2010 года по август 2019

Nino 1+2

Nino 3

Nino 3.4

Nino 4

- Эль-Ниньо
- Ла-Нинья
- Нормальное состояние

- Скользящее среднее АТПО
- Скользящее среднее отклонений альbedo

Коэффициенты корреляции

	Альbedo-ТПО
Nino 1+2	-0,81
Nino 3	-0,14
Nino 3.4	0,64
Nino 4	0,55
	Отклонения от среднего значения альbedo - АТПО
Nino 1+2	-0,14
Nino 3	0,08
Nino 3.4	0,58
Nino 4	0,68
	Скользющее среднее отклонений альbedo - АТПО
Nino 1+2	-0,22
Nino 3	0,09
Nino 3.4	0,64
Nino 4	0,73
	Скользющее среднее отклонений альbedo - индекс ONI
Nino 1+2	0,19
Nino 3	0,15
Nino 3.4	0,64
Nino 4	0,79

Корреляционная диаграмма
скользящего среднего отклонений альbedo и АТПО

Спасибо за внимание!