Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
Турбулентность, динамика атмосферы и климата

ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ТРОПИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ОЗОНА И МЕРИДИОНАЛЬНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ В ЗИМНЕЙ СТРАТОСФЕРЕ

ЕРМАКОВА Т.С. (СПБГУ, РГГМУ)

КОВАЛЬ А.В. (СПБГУ, РГГМУ)

Москва,
2024

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

продемонстрировать связь между фазами тропических атмосферно-океанических колебаний и изменениями глобального содержания озона во внетропической стратосфере в течение boreальной зимы, включая возможное образование озоновых дыр.

Ermakova, T.; Koval, A.; Didenko, K.; Aniskina, O.; Okulicheva, A. Influence of Natural Tropical Oscillations on Ozone Content and Meridional Circulation in the Boreal Winter Stratosphere. Atmosphere 2024, 15, 717. <https://www.mdpi.com/2073-4433/15/6/717>

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Фазы Эль-Ниньо Южного Колебания:

индекс Multivariate El Niño Index (MEI) <https://psl.noaa.gov/enso/mei/>

Фазы Квазидвухлетнего Колебания: расчет фазы КДК по ЕОФ

Влияние осцилляции Маддена–Джулиана и квазидвухлетнего колебания на динамику внетропической стратосферы / К.К. Кандиева, А.И. Погорельцев, О.Г. Анискина, О.С. Зоркальцева, В.И. Мордвинов // Геомагнетизм и аэронавигация. – 2019. – том 59, № 1. – С. 114-124.

DOI:10.1134/S0016794018060068

ФАЗЫ	El Niño	La Niña
WQBO	1982-1983	1998-1999
	1992-1993	2007-2008
	1994-1995	2010-2011
EQBO	1986-1987	1999-2000
	2002-2003	2011-2012
	2009-2010	2017-2018

Данные реанализа MERRA2: отношение смеси озона (кг/кг), температура, геопотенциальная высота, компоненты ветра

Расчёт остаточной меридиональной циркуляции

$$\bar{v}^* = \bar{v} - \frac{1}{\partial \bar{\theta} / \partial z} \left(-\frac{\overline{v' \theta'}}{H} + \frac{\partial \overline{v' \theta'}}{\partial z} - \frac{\overline{v' \theta'}}{\partial \bar{\theta} / \partial z} \frac{\partial^2 \bar{\theta}}{\partial z^2} \right)$$
$$\bar{w}^* = \bar{w} + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{1}{\partial \bar{\theta} / \partial z} \left(-\sin \varphi \overline{v' \theta'} + \cos \varphi \left(\frac{\partial \overline{v' \theta'}}{\partial \varphi} - \frac{\overline{v' \theta'}}{\partial \bar{\theta} / \partial z} \frac{\partial^2 \bar{\theta}}{\partial z \partial \varphi} \right) \right)$$

Koval, A. V.; Wen Chen; Didenko, K. A.; Ermakova, T. S.; Gavrilov, N. M.; Pogoreltsev, A. I.; Toptunova, O. N.; Ke Wei; Yarusova, A. N. and Zarubin, A. S. Modelling the residual mean meridional circulation at different stages of sudden stratospheric warming events. Ann. Geophys., 2021, 39, pp. 357–368; DOI: 10.5194/angeo-39-357-2021.

МОДЕЛЬ СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ

Механистическая модель (Pogoreltsev, A. I. (2007), *Generation of normal atmospheric modes by stratospheric vacillations. Izvestiya Atmos. Ocean. Phys.* 43(4), 423–435.).

В модели решается система простых гидродинамических уравнений в сферической системе координат на горизонтальной сетки 64 x 36 и 56 вертикальных уровнях – от поверхности до высоты 300 км (лог-изобарическая высота).

Фаза КДК задаётся наджингом (Koval, A.V.; Gavrilov, N.M.; Pogoreltsev, A.I.; Kandieva, K.K. *Dynamical impacts of stratospheric QBO on the global circulation up to the lower thermosphere. Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2022, 127; DOI:10.1029/2021JD036095.) **исходя из среднезональных значений зональной компоненты ветра в тропической стратосфере.**

Фаза ЭНЮК задаётся параметризацией тепла при конденсации водяного пара в нижней тропической стратосфере (1. Ermakova, T.S.; Aniskina, O.G.; Statnaia, I.A.; Motsakov, M.A.; Pogoreltsev, A.P. *Simulation of the ENSO influence on the extra-tropical middle atmosphere. Earth Planets Space*, 2019, 71, 8; DOI:10.1186/s40623-019-0987-9.

2. Ермакова Т.С., Статная И.А., Федулина И.Н., Суворова Е.В., Погорельцев А.И. *Трёхмерная полуэмпирическая климатическая модель распределения водяного пара и ее использование в радиационном блоке модели средней и верхней атмосферы // Метеорология и гидрология. 2017. № 9. С. 75–82.).*

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЗОНА В СТРАТОСФЕРЕ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ФАЗ

В условиях Ла-Нинья и восточного КДК к февралю наблюдается «кумулятивный» эффект, который выражается в самом низком содержании озона в полярной стратосфере по сравнению с другими комбинациями тропических колебаний, независимо от ВСП.

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

Среднезональное содержание озона (заливка), температура (изолинии), ОМЦ (стрелочки). Ноябрь

Ozone*10⁻⁶ [kg/kg] & RMC, & Temp, Stratosphere, November

Среднее содержание озона (заливка), температура (изолинии), ОМЦ (стрелочки). Декабрь

Ozone*10⁻⁶ [kg/kg] & RMC, & Temp, Stratosphere, December

Среднее содержание озона (заливка), температура (изолинии), ОМЦ (стрелочки) по данным реанализа. Январь

Ozone*10⁻⁶ [kg/kg] & RMC, & Temp, Stratosphere, January

Средняя температура (заливка), ОМЦ (стрелочки) в январе по данным МСВА

ВЫВОДЫ:

Характер поведения ОМЦ различен в условиях Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Перенос из тропической в полярную стратосферу во время положительной фазы ЭНЮК сильнее в тропиках на высотах, где содержание озона выше по сравнению с Ла-Нинья. Характер переноса способствует выносу озона в нижние слои мезосферы, что связано с более сильной вертикальной составляющей ОМЦ при Эль-Ниньо. Во время отрицательной фазы ЭНЮК перенос из тропиков в полярную стратосферу параллелен поверхности, и его усиление наблюдается в слоях с низким содержанием озона в тропической стратосфере.

Фаза КДК проявляется в разных распределениях озона в экваториальной стратосфере, а также в усилении/ослаблении вторичной меридиональной циркуляции в тропиках.

Разные фазы ЭНЮК и КДК могут в значительной степени компенсировать или усиливать друг друга в результирующем поле озона над полюсом. Таким образом, оценки естественной изменчивости озона должны учитывать как фазу КДК, так и фазу ЭНЮК.

ВЫВОДЫ:

Из-за особенной ОМЦ в условиях Ла-Нинья и восточного КДК к февралю наблюдается «кумулятивный» эффект, который выражается в самом низком содержании озона в полярной стратосфере по сравнению с другими комбинациями тропических колебаний. ВСП различной интенсивности наблюдались практически в каждую исследованную зиму. Вклад, который вносит отдельное ВСП в содержание озона, оценить практически невозможно. Стоит отметить, что зимой в условиях Ла-Нинья-восточного КВК также наблюдались сильные ВСП. Однако заметного увеличения содержания озона по сравнению с другими комбинациями не наблюдалось из-за слабого КДК.

Численное моделирование термодинамической структуры стратосферы для разных комбинаций ЭНЮК-КДК позволило рассмотреть статистически значимые приращения ОМЦ и температуры, вызванные изменениями рассматриваемых фаз. Преимуществом численного моделирования в данном случае стало то, что мы могли рассматривать влияние изменений фаз тропических колебаний в чистом виде, без учета дополнительных факторов, связанных с изменчивостью стратосферы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!