Модель климата ИВМ РАН.
Современное состояние, перспективы
развития, вероятное участие в
следующей фазе международного
сравнения климатических моделей

*Володин Е.М., Грицун А.С., Брагина
В.В., Черненко А.Ю., Тарасевич М.А.*

*Институт вычислительной
математики им. Г.И. Марчука РАН*

Модель климатической системы Земли включает в себя следующие блоки:

1. Динамика атмосферы, включая модель поверхности суши и почвы
2. Динамика океана и морского льда
3. Аэрозольный блок
4. Углеродный цикл (учет эволюции углерода растений, почвы, океана)
5. Электрические явления (молнии, ионосферный потенциал)

Может включать в себя также модели:

1. Динамики ионосферы
2. Эволюции ледниковых щитов
3. Биохимии океана
4. Химии атмосферы

Модель реализована на многопроцессорных вычислительных системах с распределенной памятью.

Например, при разрешении 1.25×1 градус и 73 уровня в атмосфере (верхняя граница около 60 км) и 0.5×0.25 градуса и 40 уровней в океане обычно используется 1120 вычислительных ядер:
480 ядер на динамику атмосферы
480 на аэрозольный блок
160 на динамику океана

Модель используется для:

Моделирования климата и его изменений.

Участие в CMIP3 (2003-2004), CMIP5 (2010-2011),
CMIP6 (2018-2019)

Воспроизведение исторических изменений
климата 1850-2014г.

Оценка вероятных будущих изменений
климата в 21 веке при различных сценариях

Моделирование климата прошлых эпох:

Linear TCR versus ECS for CMIP6 models

Среднегодовая ошибка температуры воздуха на 2м для 1980-2014г.

Ошибка в температуре океана

Глобально осредненная температура поверхности в 1000-летнем преиндустриальном эксперименте

Глобально осредненная температура на глубине 2000м в 1000-летнем преиндустриальном эксперименте.

Тихоокеанское десятилетнее колебание (первая ЭОФ 5-летней средней ТПО в Тихом океане) по данным модели (слева) и ERA5 (справа)

Наблюдаемое (черный) и модельное (сине-зеленый) изменение температуры воздуха у поверхности в 1850-2023г

Модель используется для:

Прогноза аномалий климата на 1-5 лет

<https://hadleyserver.metoffice.gov.uk/wmolc/> 2024-2028 from 2023

MRI

NCAR

NRL

RHMC

Меридиональная функция тока на 26.5N, 1100м. по данным наблюдений (черный) и модельного ансамбля (синий)

Модель используется для: сезонного прогноза

<https://esm-ru.ru/forecasts/seasonal-forecasts/>

T2 NDJ from 22-10-2024

0° 60°E 120°E 180° 120°W 60°W

-3.50 -2.50 -1.50 -0.50 0.25 1.00 2.00 3.00

Информацию о консорциуме модели Земной климатической системы можно найти на

<https://esm-ru.ru/>

Данные моделирования изменений климата
можно скачать на

<https://esm-data.inm.ras.ru/>

<https://esgf.llnl.gov/nodes.html>

Обязательные и быстрые эксперименты CMIP7.

<https://airtable.com/appVPW6XAZfbOZjYM/shrq9I4NJThwOT9W/tblkc1lkKEtiYKcho> - interactive experiment viewer

<https://wcrp-cmip.org/cmip7/> - описание CMIP7

DECK

amip

piControl

and

esm-piControl

1pctCO2

abrupt-4xCO2

piClim-control

piClim-anthro

piClim-4xCO2

historical

and/or

esm-historical

Additions to the DECK since CMIP6

CMIP AR7 Fast Track

Climate services

DCPP

Initialised
prediction
(2025-2036)

ScenarioMIP

High scenario

Medium scenario

Low scenario 1

Low scenario 2

Low scenario 3

Process understanding

AerChemMIP

piClim-X

hist-piSLCF/hist-piAer

SSPX-SLCF

C4MIP

1pctCO2-bgc

1pctCO2-rad

esm-flat10-cdr

esm-flat10-zec

CFMIP

amip-p4k

amip-piForcing

abrupt-2xCO2

abrupt-0p5CO2

DAMIP

hist-nat

hist-aer

hist-GHG

GeoMIP

newGeoMIP

LMIP

land-hist

PMIP

LIGabrupt

RFMIP

piClim-histaer

piClim-aer

piClim-histall

Примерное расписание CMIP7

Эффективный радиационный форсинг в 1950-2014г вследствие всех парниковых газов (красный), всех аэрозолей (синий) и их сумма (черный). Жирная линия – данные модели, тонкая штриховая линия и крестики – оценка AR6 IPCC.

Эффективные радиационные форсинги для моделей CMIP6

Smith et al. (2020) <https://doi.org/10.5194/acp-20-9591-2020>

Table 2. Effective radiative forcing from each Tier 1 time-slice RFMIP experiment for each model (W m^{-2}). Also shown is the $4 \times \text{CO}_2$ ERF scaled to 2014 concentrations (as $1.4 \times \text{CO}_2$) and the residual forcing (anthropogenic, WMGHGs, aerosol and land use). WMGHGs: well-mixed greenhouse gases. Note that not all models performed all experiments.

No.	Model	$4 \times \text{CO}_2$	$1.4 \times \text{CO}_2$	WMGHGs	Aerosols	Land use	Anthropogenic	Residual
1	ACCESS-CM2	7.95	1.80	3.04	-1.09		1.90	
2	CanESM5	7.61	1.72	2.87	-0.85	-0.08	2.37	0.43
3	CESM2	8.91	2.02	3.03	-1.37	-0.04	2.05	0.43
4	CNRM-CM6-1	8.00	1.81	2.74	-1.15		1.61	
5	CNRM-ESM2-1	7.93	1.80	2.51	-0.74	-0.07	1.66	-0.04
6	EC-Earth3	8.09	1.83	2.75	-0.80	-0.13	2.09	0.28
7	GFDL-CM4	8.24	1.87	3.13	-0.73	-0.33	2.34	0.27
8	GFDL-ESM4	7.74	1.75	3.23	-0.70	-0.28	2.17	-0.08
9	GISS-E2-1-G p1	7.35	1.67	2.89	-1.32	-0.00	1.93	0.35
10	GISS-E2-1-G p3				-0.93			
11	HadGEM3-GC31-LL	8.09	1.83	3.11	-1.10	-0.11	1.81	-0.08
12	IPSL-CM6A-LR	8.00	1.81	2.82	-0.63	-0.05	2.32	0.18
13	MIROC6	7.32	1.66	2.69	-1.04	-0.03	1.80	0.17
14	MPI-ESM1-2-LR	8.35	1.89	2.69		-0.10	2.13	
15	MRI-ESM2-0	7.65	1.73	3.03	-1.21	-0.17	1.95	0.29
16	NorESM2-LM	8.15	1.85	2.80	-1.21	0.26	2.06	0.20
17	NorESM2-MM	8.38	1.90		-1.26			
18	UKESM1-0-LL	7.94	1.80	2.95	-1.11	-0.18	1.79	0.12
	Mean	7.98	1.81	2.89	-1.01	-0.09	2.00	0.20
	SD	0.38	0.09	0.19	0.23	0.13	0.23	0.17

Изменение глобального углерода растительности (ГтС) по отношению к 1850г в 1850-2100г (сценарий *ssp3-7.0*) при учете всех воздействий (черный), вклад землепользования (желтый), изменения климата (зеленый) и концентрации CO₂ (красный)

То же для углерода растений на территории России