Спектральные характеристики мезомасштабной турбулентности в устойчиво-стратифицированной атмосфере, полученные по данным самолетных измерений и инфразвукового зондирования атмосферы.

¹Чунчuzов И.П., ¹Попов О.Е., ¹Чхетиани О.Г., ¹Куличков С.Н.,
²Белан Б.Д., ²Фофонов А.В., ²Ивлев Г.А., ²Козлов А.В.

¹ *Институт Физики Атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва*

² *Институт Оптики Атмосферы им. В.Е. Зуева РАН, Томск*

E-mail: igor.chunchuzov@gmail.com

Содержание

- Самолетные измерения мезомасштабных флуктуаций скорости ветра, температуры и концентраций газовых составляющих в устойчиво-стратифицированной тропосфере.
- Модель формирования 3-х мерного спектра флуктуаций
- Горизонтальные спектры в диапазоне масштабов 400 м-200 км
- Наклонные спектры флуктуаций в тропосфере
- Сравнение с вертикальными спектрами флуктуаций скорости ветра в стратосфере, восстановленными по данным инфразвукового зондирования атмосферы.

Самолетные исследования флуктуаций метеопараметров, примесей и их спектров

1. Bacmeister J. T., S. D. Eckermann et al. (1996). *J. Geophys. Res.*, D101, 9441–9470.
2. Berkes F. et al. (2017). *Atmospheric Chemistry and Physics*. V. 17, 20.
3. Bacmeister J. T., S. D. Eckermann et al. (1996). *J. Geophys. Res.*, D101, 9441–9470.
4. Винниченко Н. К., Н. З. Пинус, С. М. Шметер, Г. Н. Шур. Турбулентность в свободной атмосфере. Гидрометеиздат, 1976 г
5. Callies J., R. Ferrari, and O. Bühler (2014). *Proc. Natl. Acad. Sci. U S A*. V. 111(48).
6. Cho J.Y.N., Zhu, Y., Newell R.E., et al. (1999). *J. Geophys. Res.* 104, 5697–5716.
7. Chunchuzov I., O. Chkhetiani, S. Kulichkov, O. Popov, B. Belan, A. Fofonov, G. Ivlev, A. Kozlov. (2023).. *J. Atm. Sci.*, 81, 105-124.
8. Гурвич А. С. и В.П. Кухарец. (2008). *Изв. РАН Физика атмосферы и океана* Т. 44(6).
9. Imazio P. R., P. D. Mininni, A. et al. (2023). *J. Geophys. Res. Atmospheres*, <https://doi.org/10.1029/2022JD037491>.
10. Knobloch S., Kaifler B., Dornbrack A., & Rapp M. (2023). *Geophys. Research Letters*, V.50.
11. Lilly D. K. and P. F. Lester (1974). *J. Atmos. Sci.*, V.31, 800-812.
12. Lindborg E. (2015).. *J. Fluid Mech.*, 762, R4, doi:10.1017/jfm.2014.685.
13. Lumley J. L. (1964). *J. Atm. Sci.*, 21, 99-102.
14. Lumley J. L., and H. A. Panofsky (1964). *The structure of atmospheric turbulence*. John Wiley & Sons Inc., 244 pp.
15. Myrup L.O. (1969). *Tellus*, V.21(3), 341-353.
16. Nastrom G. D. and K. S. Gage. (1985). *J. Atmos. Sci.*, V. 42, 950–960.
17. Andreas Petzold, Valerie Thouret et al. (2015). *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*, 67, 1, 28452, DOI: 10.3402/tellusb.v67.28452.
18. Schumann U. (2019). *J. Atmos. Sci.*, 76, 3847-3862,
19. Skamarock W. C., S. H. Park, J. B. Klemp, and C. Snyder (2014). *J. Atm. Sci.*, 71.
20. Stephens B. B., Morgan E. J. et al. (2021), *Atmos. Meas. Tech.*, 14, 2543–2574

3-х мерный спектр флуктуаций температуры

[Chunchuzov I., 2002: J. Atm. Sci., V. 59, 1753-1777; Chunchuzov I., 2018: J. Atm. Sci., V.75 (10). 3447-3467]

$$\Phi_T(k_{\perp}, k_z) = \frac{T_0^2 N^4}{g^2} S_{3E}(k_{\perp}, k_z), (k_z^* < k_z < k_w) \quad T_0 \text{ -средняя температура}$$

$$S_{3E}(k_{\perp}, k_z) = \frac{A_0}{|k_z|^5} \exp\left(-\frac{k_{\perp}^2}{4e_0 k_z^2}\right), \quad k_{\perp}^2 = k_x^2 + k_y^2, \quad e_0 \ll 1$$

$$A_0 = \beta_0 / (8\pi e_0) \quad \beta = 0.2$$

$e_0 = \langle (\nabla_{\perp} S_v)^2 \rangle = \frac{M^2}{\chi^2} \geq \frac{M^2}{N^2} f^2 \ll 1$ - параметр анизотропии, f - параметр Кориолиса

σ^2 - дисперсия флуктуаций скорости ветра, вызванных ВГВ, N - частота БВ,
 $l_v = 2\pi k_z^{*-1}$ - внешний вертикальный масштаб, $M \equiv \frac{\sigma}{N l_v}$ - параметр нелинейности,

$k_z^* = \frac{N}{\sigma \sqrt{2}}$ - характерное вертикальное волновое число,
 $\chi^2 = \sigma^2 / \sigma_w^2$ - отношение дисперсий горизонтальных и вертикальных скоростей,

$k_w = k_z^* \exp(\beta_0^{-1})$ - критическое вертикальное волновое число, на котором возникают процессы обрушения волн из-за сдвиговых и конвективных неустойчивостей

Вертикальные спектры

флуктуаций горизонтальной скорости

$$V(k_z) = \beta_0 N^2 k_z^{-3}, \quad k_z^* \ll k_z < k_w$$

относительных флуктуаций температуры

$$F_T(k_z) = \beta_0 N^4 g^{-2} k_z^{-3} \quad \beta_0 \sim 0.2$$

-в состоянии
нелинейного
насыщения
при $M=0.35-0.40$

Горизонтальный спектр

флуктуаций горизонтальной скорости

$$\tilde{V}_{E,\perp}(k_x) = 4e_0 \beta_0 N^2 k_x^{-3}, \quad k_x \gg k_x^* = 2\sqrt{e_0} k_z^*$$

$$l_x / l_z = 1 / \sqrt{4e_0} \sim \chi / M \gg 1$$

-отношение масштабов
анизотропных неоднородностей

$$M = 0.35-0.4 \quad \text{-нелинейное насыщение спектра}$$

Параметры спектров: $N, \quad f, \quad \sigma, \quad \chi = \sigma / \sigma_w$

Измерения (ИОА РАН) на самолете-лаборатории Ту-134 «Оптик» в Арктическом регионе России в сентябре 2020 г. и 2022 г.

Измеряемые газовые составляющие (Table 1), приборы, точности измерений

TABLE 1. Measured gas constituents, instruments/sensors, measurement errors, and time constants.

Block	Device	Parameter	Range	Accuracy	Time constant
Gas analysis complex	Analyzer model 42i-TL	NO _x	0 ... 1000 ppb	±1%	60 s
		SO ₂	0 ... 100 ppm	±1%	60 s
	TEI model 49C	O ₃ , ppm	0 ... 200	0.001 ppm	4 s
	TEI model 48C	CO, ppm	0 ... 1000	±1%	1 s
	LI-6262	CO ₂ , ppm	0 ... 1000	<0.2 ppm	1 s
	ME 9850B	SO ₂ , ppm	0 ... 20	±1%	<20 s
	Model CLD 780 TR	NO _x , ppm	0 ... 0.5	<0.003 ppm	1 s

Метеорологические параметры (Table 2)

TABLE 2. Measurements of meteorological parameters, instruments/sensors, units, and accuracy (time constant 1 s and measurement step 1 s).

Parameter (device)	Units	Accuracy
Flight altitude, by static pressure (electromechanical altimeter VEM-72)	m	10 m
Air temperature (HYCAL Sensing Products Honeywell Inc., model: IH-3602C)	°C	0.5°C, with step 0.1°C, (-70 ... +70)
Full braking air temperature (resistive-type sensor)	°C	0.5°C
Relative humidity (HYCAL Sensing Products Honeywell Inc., model: IH-3602C)	%	7% c with step 1%(0 ... 100)
Atmospheric pressure (Motorola MPX4115AP)	mm Hg	1.5%, 100–860 mm Hg
Aircraft speed (DISS-3A “Strela”)	km h ⁻¹	1 km h ⁻¹
Aircraft speed relative to the air	km h ⁻¹	1 km h ⁻¹

(a) Траектории полета с горизонтальными и наклонными трассами

Данные радиозондирования

Профили температуры 08 Сентября 2022

Профили квадрата частоты Брента-Вьяйсяля 08 Сентября 2022.

Профили зональной и меридиональной скорости ветра в 12:00, 8 сентября 2022

Устойчивая стратификация в слое 9.5-10.5 км, в котором проходила трасса 1 (высота 9540 м ±35м) и трасса 2 (высота 9220 м ±60 м)

Горизонтальные спектры флуктуаций скорости ветра, E_{kin} , температуры, NO_2 , NO , нормированные на дисперсии флуктуаций

Horizontal spectra of the fluctuations of wind velocity E_{kin} , temperature, NO_2 and NO , 2022, Segment 1

Трасса 1:

$$\sigma \sim 3 \text{ м/с}, \quad N = 0.02 \text{ рад/с},$$

$$\chi = 2, \quad f = 1.25 \cdot 10^{-4} \text{ рад/с},$$

$$M = 0.4, \quad e_0 \sim 0.005,$$

Горизонтальный масштаб

$$L^* = 2\pi / k_x^* \approx 2\sqrt{2\pi\sigma\chi} / (M \cdot N)$$

$$L^* \sim 6 \text{ км}$$

Horizontal spectra of the fluctuations of wind velocity E_{kin} , temperature, NO_2 and NO , 2022, Segment 2

Трасса 2:

$$\sigma \sim 9 \text{ м/с}$$

$$L^* \sim 20 \text{ км}$$

Флуктуации меридиональной (mw) и зональной (zw) компонент скорости ветра над Гренландией, 24 марта 2021

(по данным измерений гражданскими самолетами: <http://www.iagos.org>)

Подтверждение результатов ранних самолетных исследований (Shur 1962; Myrup 1969; Lilly and Lester 1974; Винниченко и др. 1976; Backmeister et al. 1996), указывавших на существование подобласти плавучести.

Схема пересечения анизотропных неоднородностей и “зон турбулентности” горизонтальными и наклонными трассами

Первая работа по наклонным спектрам [Гурвич А. С. и В.П. Кухарец (2008).Изв. РАН Физика атмосферы и океана Т. 44(6)]

Наклонные профили флуктуаций температуры (t), концентрации NO и скорости ветра, нормированные на их среднеквадратические значения (std)

Наклонные спектры флуктуаций скорости ветра (mw),
полученные по пяти подъемам и трем спускам Ту 134 и средний спектр

Гистограмма распределения спектров
по их наклонам

Восстановленные с помощью инфразвуковых сигналов от 3-х извержений вулкана в Эквадоре (с интервалом в 15 мин) профили флуктуаций C_{eff} и скорости ветра на высотах стратосферы (25-55 км) и нижней термосферы (105-140 км)

Нижняя термосфера
105-140 км

Стратосфера
25-55 км

Вверху: Вертикальные спектры флуктуаций горизонтальной скорости ветра в стратосфере, восстановленных по данным инфразвукового зондирования, и наклонные спектры, полученные по подъемам и спускам самолета TU 134 (Average Arctic Spectrum) и пассажирских самолетов. Внизу: Наклонные спектры в тропосфере и вертикальные спектры(PSD) (Vorobeva et al. 2023, JGR, 2023. V.128 (13)) для восстановленных флуктуаций в стратосфере, их средний спектр (темно-серая линия) и теоретические спектры из моделей (Dewan and Good 1986, JGR, V.91) и (Churchuzov et al. 2015, *J. Acoust. Soc. Am.* V. 137).

Заключение

1. На основе анализа мезомасштабных флуктуаций температуры и скорости ветра вдоль горизонтальных трасс самолетов в устойчиво-стратифицированной тропосфере арктической зоны России и над Гренландией (выше 60° с.ш.) подтверждено существование перехода от спектра $-5/3$ Настрома-Гейджа к более крутой части спектра на коротких масштабах. Наличие этого перехода в подобласти плавучести обнаруживалось в ранних самолетных исследованиях, но его существование не учитывалось в большинстве современных моделей горизонтального спектра.
2. Теоретическая модель 3-х мерного спектра флуктуаций объясняла переход от спектра $-5/3$ к более крутому спектру на определенном масштабе, который оценивался из данных радиозондирования и самолетных измерений.
3. Тропосферные наклонные спектры скорости ветра (диапазон высот 5-12 км), полученные по данным самолетных измерений вдоль наклонных трасс, показали тот же степенной закон спада (близкий к -3) с уменьшением вертикальных масштабов, что и вертикальные спектры в стратосфере, полученные по инфразвуковым сигналам от взрывов и извержений вулканов. Этот факт подтверждал существование общего механизма формирования тонкой слоистой структуры температуры и скорости ветра и их спектров как в устойчиво-стратифицированных слоях тропосферы, так и в стратосфере. Этот механизм, как было показано, связан с совместным влиянием плавучести и нелинейных эффектов адвекции на формирование спектров.