Вертикальное перемешивание и обмен в условиях сильной мезомасштабной динамики и экстремального атмосферного воздействия

Дмитрий Степанов¹ Надежда Сачнева¹ Александр
Островский² Анна Шестакова³

¹Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева, г.
Владивосток

²Институт океанологии им. П.П. Ширшова, г. Москва

³Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова, г. Москва

РНФ 23-27-00333
19-21 ноября 2024, г. Москва

- **Интенсификация вертикального перемешивания:** Мезомасштабные вихри и тропические циклоны интенсифицируют вертикальное перемешивание и обмен (MacKinnon et al, 2017).
- **Цель:** Причины и механизмы интенсификации вертикального перемешивания и обмена, в зоне Приморского течения (Японское море).
- **Данные и подходы:** Совместные тонкоструктурные измерения вертикальных профилей температуры, электропроводности (солености), давления, скорости течения и растворенного кислорода в северо-западной части Японского моря с 18 апреля по 15 октября 2015г.
- Численное моделирование отклика прибрежной циркуляции на прохождение циклона Goni (модель COAWST)

Район и схема постановки заякоренной станции

Степанов и др.

- Место постановки заякоренной станции обозначено звездой красного цвета
- Скорость профилирования - 0.2 м/с каждые 6 часов с 18 апреля по 15 октября 2015 г.
- Инструменты: SBE CTD 52-MP, датчик растворенного кислорода - SBE43F и скорости течения - Nortek Aquadopp 2 МГц. CTD измерения были проведены через 0.2 м.
- Температура поверхности моря (ТПМ) в момент прохождения мезомасштабного вихря через станцию (26 июня 2015)

Динамические условия в районе заякоренной станции

Параметризация вертикального перемешивания. Метод перестановок Торпа

Параметризация вертикального потока плавучести J_b имеет вид

$$J_b = -\frac{g}{\rho_0} \overline{\omega' \rho'} = -\frac{g}{\rho_0} K_\rho \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial z} = K_\rho N^2, \quad \text{где } K_\rho \text{ - коэффициент}$$

эффективного обмена массой.

Соотношение Осборна (Osborn, 1980)

$$J_b \approx \Gamma \varepsilon, \quad \text{где } \Gamma = 0.2.$$

Интенсивность диссипации кинетической энергии турбулентности

$$\varepsilon = 0.64 L_T^2 N^3$$

Масштаб Торпа (Thorpe, 1977)

$$L_T = \langle (z_n - z_m)^2 \rangle^{1/2}, \quad n \in R,$$

где $\langle \dots \rangle$ обозначает осреднение внутри турбулентного пятна, z_n

- положение жидкого элемента до перестановки, а z_m - после

перестановки. $K_\rho = 0.2 \frac{\varepsilon}{N^2}$.

Вертикальные потоки тепла и соли:

$$Q = -c_p \rho_0 \cdot K_\rho \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z}, \quad J_s = -K_\rho \frac{\partial \bar{S}}{\partial z}$$

Метод перестановок Торпа. Пример

Профили потенциальной плотности (σ_θ), частоты плавучести (N), смещения ($L_d = (z_m - z_n)$) и интенсивности диссипации турбулентной кинетической энергии (ϵ_K) на 00:00:18 26 апреля 2015 г.

Вертикальный обмен и мезомасштабный вихрь

Коэффициент эффективного обмена (K_ρ , $\text{м}^2/\text{с}$), вертикальный поток тепла (Q , $\text{Вт}/\text{м}^2$) и вертикальный поток соли (J_S , $\text{е.п.с.}/\text{м}/\text{с}$) в период прохождения мезомасштабного вихря через заякоренную станцию с 3 по 8 июня 2015 г.

Вертикальное перемешивание и шторм Goni

$\text{Log}_{10}(K_\rho)$,
 $\text{м}^2/\text{с}$

Описание сопряженной мезомасштабной модели атмосферы и океана COAWST для Японского моря

Параметры модели COAWST

Циркуляция моря	ROMS
Топография дна	ETOPO2
Горизонтальное разрешение	1 × 1 км
Вертикальное разрешение	26 уровней
Приливное воздействие	база данных OSU TPXO
Параметризация вертикального обмена	схема первого порядка LMD
Начальные и граничные условия	база данных GOF3.1 (HYCOM)
Модель атмосферы	WRF-ARW
Горизонтальное разрешение	5 × 5 км
Вертикальное разрешение	50 уровней
Начальные и граничные условия	база данных ERA5
Параметризации	приземный и погранслои в атмосфере QNSE
Период расчетов	25 авг. - 8 сент. 2015
Интервал сопряжения	10 мин

Результаты COAWST. Температура поверхности моря в период прохождения тропического циклона Goni.

Поток плавучести J_b . Сравнение.

$$J_b^{COAWST} = -\frac{g}{\rho_0} \overline{w' \rho'}, \quad J_b^{Aqualog} = K_\rho N^2,$$

Нереалистично "сильная" стратификация привела к переоценке потока плавучести (J_b) при прохождении тропического циклона Goni.

- 1 На основе совместных тонко-структурных измерений термохалинной стратификации и скорости течений в северо-западной части Японского моря, с помощью метода перестановок Торпа получены количественные оценки интенсивности вертикального перемешивания и обмена над континентальным склоном при условии интенсивной мезомасштабной динамики и экстремального атмосферного воздействия
- 2 Интенсивное вертикальное перемешивание наблюдается на переднем и заднем фронте мезомасштабных вихрей, а также на их нижней границе.
- 3 Мезомасштабные вихри ответственны за интенсивный вертикальный обмен теплом и солью. Поток тепла направлен, преимущественно, в нижележащие слои, а вертикальный поток соли - меняет направление с глубиной.
- 4 Предложена модельная конфигурация ROMS+WRF, которая была использована для воспроизведения отклика северо-западной части Японского моря на прохождение тропического циклона Goni. Получена переоценка вертикального потока плавучести, обусловленная нереалистично "сильной" стратификацией.